

辨色困难或视物模糊的药物

1. 解热镇痛药：布洛芬（易引起头晕，头痛，少数人可致视力降低和辨色困难）；吲哚美辛（可致视力模糊、耳鸣、复视）。
2. 扩血管药二氢麦角碱：可致视物不清。
3. 解除胃肠痉挛药：阿托品：可致驾驶员视近物不清或模糊；东莨菪碱：可扩大瞳孔，持续 3-5 天，出现视物不清。
4. 硝酸甘油：可出现视物模糊。
5. 抗癫痫药：卡马西平、苯妥英钠、丙戊酸钠可引起视物模糊、复视或眩晕。
6. 抗精神病药：利培酮可出现视物模糊、注意力下降。

可使驾驶员出现定向力障碍的药物

1. 哌替啶：偶致定向力障碍、幻觉。
2. 抑酸药：雷尼替丁、西咪替丁、法莫替丁可引起幻觉、定向力障碍。
3. 避孕药：长期服用也可使视网膜血管发生异常、定向力发生障碍、左右不分。

可致驾驶员多尿和多汗的药物

1. 利尿剂：阿米洛利及其复方制剂服后尿液排出过多，出现口渴、头晕、视力改变。
2. 抗高血压药物：复方利血平-氨苯蝶啶片、吲达帕胺（易引起尿量多，尿频）；哌唑嗪（易引起尿频、尿急）。

提醒

1. 服药之前请仔细阅读药品说明书。
2. 开车前 4 小时慎用上述药物，或服用后休息 6 小时再开车。