

感染后还有必要接种新冠疫苗吗？

来源：人民日报微博



当前疫情 最新热点十问十答

XBB 系列变异株会引发大规模流行吗？抗病毒药物、球蛋白有必要囤吗？返回乡镇过年如何做好防护？针对当前公众关切的诸多疫情热点问题，国务院联防联控机制专家进行了解答。

1

XBB 系列变异株 会引发大规模流行吗？

答

近三个月以来，我国已监测到 BF.7、BQ.1、XBB 传入，但 BQ.1 和 XBB 在我国尚未形成优势传播。

我国目前本土流行的新冠病毒绝对优势毒株是 BA.5.2 和 BF.7，个体在感染后产生的中和抗体，在短期内（3 个月）会维持相对较高水平，预期对其他奥密克戎变异株分支（包括 XBB）有较好的交叉保护作用。**我国短期内由 XBB 系列变异株引发大规模流行的可能性低。**

——中国疾控中心病毒病所所长许文波

2

XBB 会引发严重的 呕吐和腹泻吗？

答

一些新冠病毒感染者确实有呕吐和腹泻症状，通常 1 至 3 天可以自行缓解，没有发现 XBB 毒株更容易侵犯心脑血管系统和消化系统。和预防其他奥密克戎亚型病毒感染一样，个人还是要做好自身健康的第一责任人。

——首都医科大学附属北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾

3

感染后还有没有必要 接种新冠疫苗？

答

目前来看，单纯感染产生的免疫保护力，不如感染加上接种疫苗产生的混合免疫力保护作用强，所以后期如果需要接种疫苗的话，建议还是要接种疫苗。

研究表明，通过接种加强针，可以唤起机体的免疫记忆细胞，也会提升抗体水平，进一步巩固对重症和死亡的预防作用。所以，没有完成加强免疫的人群，只要符合接种条件，应尽快按照免疫程序的规定完成加强免疫，以起到更好的保护效果。

——中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆