夜半突袭的肛门痛 中医治疗来破局

本文作者 ▮ 汤景杰 专业审稿 ▮ 郭爱松

郭爱松: 通大附院主任中医师, 教授, 硕导

擅长:头痛、眩晕、失眠、郁证、虚劳、多汗等内科疑难杂症及 老年病、慢性病的中西医治疗;疼痛诊疗、神经康复;肉毒毒素 注射治疗。

门诊时间:周二(东院区),周一上午、周三上午(西院区)





扫码读手管科单立管

夜深人静,熟睡正酣,一阵突发的"刀割样、电击样或痉挛样"的剧痛突然从肛门深处袭来,让人瞬间惊醒,冷汗涔涔,坐立难安,却找不到任何伤口或肿块,疼痛短则数秒,长则半小时,随后又神秘消失,可能出现腰骶部、大腿区放射痛,这种说不清道不明的"肛门抽筋"很可能就是功能性肛门直肠痛(Functional Anorectal Pain, FAP)在作祟!抑或是肛门坠胀不适,伴灼热感、刺痛感甚或蚁行感,这种情况常反复发生,晨起较轻,排便或久坐后症状加重。虽不致命却严重影响生活,且极易被误诊。今天就来揭开它的神秘面纱!

什么是功能性肛门直肠痛?

根据国际罗马 IV 标准,功能性肛门直肠痛需满足以下核心定义: 反复发作的肛门直肠区域疼痛,排除痔疮、肛裂、肿瘤等器质性疾病, 且症状持续至少 6 个月,在近 3 个月内还需契合以下分型标准:

根据疼痛特点分为三类:

- 1. 肛提肌综合征 (LAS): 钝痛或坠胀感, 持续≥ 30 分钟, 指检时肛提肌压痛明显 (左侧更常见), 通常坐着比站着或躺着更严重;
 - 2. 非特异性肛门直肠痛(UFAP):疼痛性质类似 LAS,但指检无压痛;
- 3. 痉挛性肛门痛(PF): 突发剧痛如电击, 持续数秒至数分钟, 可夜间惊醒患者, 发作后完全缓解。