



右三为主任医师苏敏

低分子肝素,术前 24 小时停用低分子肝素(为手术安全留出窗口)。术中:手术团队高度戒备,手术顺利,虽然出现了轻微渗血,但被迅速有效控制。术后:术后 24 小时不到恢复低分子肝素抗凝,术后 48 小时情况稳定,重启华法林抗凝,并监测其效果达标后,再安全撤掉低分子肝素“桥梁”。医生特别说明,华法林不影响母乳喂养。

圆满结局,医学协作迎接新生命

随着一声响亮的啼哭,健康的宝宝平安降生。经过精心护理,小玲术后也恢复良好。这场贯穿整个孕期和分娩过程的高危“双保”战役,在通大附院心脏大血管外科、产科、药学部等多学科顶尖团队的精密协作与无缝配合下,画上了圆满的句号。

怀抱来之不易的宝宝,小玲和家人终于走出了那段在“保心”与“护胎”

间艰难抉择的阴霾。通大附院专家团队的专业医术、勇于担当和精细化管理,成功守护了这个珍贵的新生命。



苏敏

通大附院主任医师,副教授,硕导

擅长: 妇产科常见病、多发病的诊治,包括高危产科疾病、妇科内分泌疾病、妇科炎症的诊断与治疗,熟练操作高危产科助产手术,尤其产科合并症、并发症等疑难复杂疾病诊治和术前术后相关问题的评估、决策和处理。

坐诊时间:

周二(西院区)